



Escabiosis

Dpto. Salud Pública
Facultad Manuel Fajardo

Descripción

Infestación de la piel causada por un ácaro, cuya penetración se manifiesta por pápulas, vesículas o surcos lineales que contienen al parásito y sus huevos. Produce prurito intenso.

Localizaciones: espacios interdigitales y dorso de las manos, flexura de las muñecas, codo, cara anterior del hueco axilar, cintura pélvica, glúteos, piernas y genitales externos. En mujeres pezones y abdomen. En lactantes: cuero cabelludo, cara y planta de los pies.

Cadena Epidemiológica

Agente: Ácaro *Sarcoptes scabiei*

Reservorio: exclusivamente humano

Puerta de salida: piel del reservorio

Vía de la transmisión: por contacto con la piel infestada. Por relaciones íntimas y por ropas interior o de cama.

Puerta de entrada: piel

Huésped susceptible: todas las personas

Periodo de incubación: 2 a 6 semanas antes del prurito para la primera vez y de 1 a 4 días después de la nueva exposición.

Periodo de transmisibilidad: mientras existan ácaros en la piel.

Medidas de Control

Sobre el agente en su reservorio

- Diagnóstico de certeza y notificación de brotes
- Tratamiento específico que se repite a los 7 días; debe hacerse a todos los miembros de la familia el mismo día.

Medidas de Control

Sobre la Vía de la Transmisión

- Medidas de control higiénico general y personal
- Desinfección concurrente mediante lavado y hervido de ropa interior y de cama de la ropa utilizada antes del tratamiento.

Sobre el huésped susceptible

Educación sanitaria sobre el modo de transmisión, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de enfermos y contactos.